

<アスパラ葉面散布肥料使用例>

| 使用時期 | 商品・目的 | | 備考 |
|--|---|---|--|
| <p>萌芽期 以降</p> | <p>【アイスバリア】</p> <p>・霜・低温による穂先のトロケ、ヤケ、変色軽減</p>  <p>100倍～300倍</p> | | <p>速乾性カルシウム</p> <p>【バイカルティ】</p> <p>1,000倍</p>  |
| <p>立茎期間 殺菌剤に加用</p> <p>※コサイド 3000 使用時は バイカルティ加用</p> | <p>【トップスコア・リン】</p> <p>・免疫抵抗性強化（茎枯れなど）</p> <p>・健全生育</p> <p>・根張り促進 ・光合成促進</p>  <p>500倍×3～4回</p> | | <p>・薬液の速乾性向上</p> <p>※コサイド 3000</p> <p>使用毎に加用</p> |
| <p>6/下旬～8/下旬</p> <p>※コサイド 3000 使用時は バイカルティ加用</p> | <p>【トップスコア・リン】</p> <p>・免疫抵抗性向上</p> <p>※日照不足時、多雨時は状況に応じて散布</p> <p>1000倍</p> | <p>【アイスバリア】</p> <p>・高温、干ばつ時のしおれ対策</p> <p>・鮮度保持</p> <p>・蒸散抑制</p> <p>300～500倍×3回</p> | <p>・カルシウム補給 (トロケ対策、日持ち向上)</p> <p>・カルシウム欠乏</p> |
| <p>9月～10月</p> <p>※コサイド 3000 使用時は バイカルティ加用</p> | <p>【トップスコア・リン】</p> <p>・養分転流促進、株充実・糖度向上</p> <p>・未消化チツソの消化、黄化促進</p>  <p>1000倍×3～4回</p> | | <p>(タケノコ茎、へん平茎、曲がり茎、中芯空洞、縦筋症)対策</p> |

※散布量は農薬に準ずる