

植物成長調整剤 りんごの摘花剤 蟻酸カルシウム水溶剤



りんご用

摘果作業の省力化!!
人手不足、高密植わい化栽培に!!

エコルーキー[®]

有効期限
5年



荷姿及び包装

・5kg×4袋

◆成分◆ (%)

蟻酸カルシウム	98.0
水分等	2.0

◆性状◆

●白色水溶性粉末

◆使用目的◆

●りんごの摘花

製品特長

当社肥料製品【スイカル】と同成分である有機酸（蟻酸）カルシウムを植物成長調整剤（摘花剤）として登録取得した粉剤です。

摘果作業の省力化となり人手不足の解消につながります。

人体や訪花昆虫、ハウス資材、スプレーヤーなどに対する悪影響が少なく、周辺環境に対してとても安全です。


サビ果の原因とならないクリーンで匂いの少ないりんごの摘花剤です。

受粉環境向上につながる「プラスB」との体系施用をオススメします。

◇使用方法◇

作物名	使用目的	希釈倍数 10aあたり使用量	使用時期	本剤使用	使用方法
りんご	摘花	100～150倍 300～600ℓ	満開日と追加散布する 場合はその2～3日後	2回以内	立木全面散布

◇散布タイミング例◇



●初めて使用する方で、落ちすぎが不安な方はえき花芽を狙い1回散布するだけでも省力化となります

★新提案 頂花芽狙い（1回目散布）が不安な方へ ⇒ えき花芽を狙い2回散布

※効果発現しにくい条件

●頂芽とえき花芽がほぼ同時に開花した年や低温により極端に開花期間が長引く年

●散布適期を逃した場合

◇エコルーキー散布後◇

・エコルーキーを散布したのち、
5～7日で効果が確認できるようになります



◇園主感想◇

摘果作業の省力化になり労働経費の削減につながった

◇使用上の注意◇

- ・単用で使用して下さい。
- ・なるべく人工授粉を実施して下さい。プラスBとの体系施用を推奨。
- ・開花量が多く、開花中の好天による結実が十分と見込まれる時に実施して下さい。
- ・樹全体（特にメシベ）に薬液が付着するように散布して下さい。
- ・スプレーヤーを使用する場合は、ファンを停止又は低回転にして散布して下さい。
- ・樹勢が弱い場合、葉縁の褐変が出る場合がありますが、実害はありません。
- ・散布後、花弁が褐変しますが実害はありません。
- ・使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意して下さい。

◇保管◇ 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温、乾燥した場所に密封して保管して下さい

●荷姿及び包装： 5kg×4袋

製造元 晃栄化学工業株式会社 **Koei Chemical**

本社 〒460-0003

名古屋市中区錦1-7-34 ステージ錦I

TEL：(052) 211-4451 FAX：(052) 211-4579

札幌営業所 TEL：011-707-4531

弘前営業所 TEL：0172-27-1768

松本営業所 TEL：0263-32-4441

熊本営業所 TEL：096-365-2081

～インスタ配信中～



KOEI.CHEM

ぜひフォローお願いします♪