

白く
汚れない!

速乾性強化カルシウム肥料



サンバリア®



◆成分◆ (%)

カルシウム (CaO)	25.0
----------------	------

◆使用目的◆

- 果点アレ、果点サビ軽減
- 陽向面ヤケ対策（リンゴ）
- 日ヤケ軽減
- カルシウム補給
- 生理障害対策
- 薬液乾燥促進
- 薬液付着性向上
- 薬液汚染軽減

荷姿及び包装

・ 1 kg×20袋

製品特長

2種類のカルシウム成分を配合した粉剤です。散布後白く汚れません。
カルシウム補給、果皮の保護と薬液乾燥促進による薬斑軽減の効果があります。

例) 有機銅剤、無機銅剤→展着材配合による付着向上

果菜類の日ヤケやりんごの陽向面ヤケ、果皮障害などの対策としてご活用ください。

◇使用方法◇

農薬使用時期に散布可能

倍数、回数に制限はなし

作物	散布目的	散布時期	倍数
りんご	カルシウム欠乏(ビターピット、コルクスポット、軟化、油上がり) 対策、貯蔵性向上 薬液乾燥促進 (果面障害)	落花 10 日後頃から 3 ~ 5 回	1,000 倍 ※応急時 500 倍
	陽向面ヤケ・日ヤケ軽減 ビターピット対策 果点アレ・サビ対策 薬液乾燥促進、果実汚染軽減	7/ 下旬以降 3 ~ 5 回	

梅雨明け後、7/ 下旬以降は複数回の継続散布を推奨

作物	散布目的	散布時期	倍数
ラ フランス	・日ヤケ軽減・カボチャのクリスタル症軽減 ・カルシウム補給 ・薬液乾燥促進 ・果実汚染軽減	7/ 下旬 ~ 9/ 下旬 3 ~ 5 回	1,000 倍 ※応急時 500 倍
プルーン		7/ 中旬 ~ 2 ~ 3 回	
梅・アンズ		果実肥大期 ~ 定期的に散布	
スイカ・メロン・カボチャ		肥大中期 ~ 肥大後期 2 ~ 3 回	

最高気温33℃以上予想時は**500倍散布を推奨**

すべての作物に使用可能

例)りんご、スイカ

〈一般的な日ヤケ果〉



夏季の高温・乾燥による日ヤケ、クリスタル症



〔圖主感想〕 ①7/下旬~9/中旬までサンバリアを4回継続散布したら、ふじの硬度が保った。

〈果点アレ、果点サビ〉




夏季の高温により発生が助長

②ふじの果点アレ、サビが軽減され、油上がりもなく等級が良くなった。夏季は毎年使いたい。

◇使用上の注意◇

- ・リン酸系肥料との混用は避けてください
- ・当社亜リン酸製品(トップスコア・リン)との混用散布が可能ですが(別々に溶かしたものを混用してください)
- ・開封後、固まる恐れがありますので、出来るだけ使いきってください

製造元 晃栄化学工業株式会社 

本社 〒460-0003

名古屋市中区錦1-7-34 ステージ錦 I

TEL : (052) 211-4451 FAX : (052) 211-4579

札幌営業所 TEL:011-707-4531

弘前営業所 TEL:0172-27-1768

松本営業所 TEL:0263-32-4441

熊本営業所 TEL:096-365-2081

~インスタ配信中~



KOEI.CHEM

ぜひフォローお願いします♪