＜スイカの葉面散布肥料使用例＞

晃栄化学工業(株)

使用時期	商品・目的			
つるひき時	草勢:強～中の場合 【トップスコア・リン】1000 倍 ・根張り促進　・着果促進 ・花芽分化　・ツルぼけ防止	草勢:弱い場合 【アミノベスト】1000 倍 ・草勢維持	【バイカルティ】 1000 倍(防除毎) ・カルシウム補給 ・薬液の乾燥促進 ※各種銅剤の使用時期に散布することで特徴が発揮 ※梅雨時期や多湿時は特に加用をオススメ	通年使用 高温障害対策 【エキタイマグ】 (酢酸マグネシウム) 500倍 ・苦土欠対策 ・葉色向上 ・光合成増進 ・乾燥・高温耐性強化
交配 10 日前 交配 肥大前期	【トップスコア・リン】500 倍×2 回	【アミノベスト】1000 倍 ・草勢維持		
	草勢:弱～中の場合 【アミノベスト】1000 倍 ・草勢維持 ・葉巻きたんそ対策	草勢:強い場合 【トップスコア・リン】 ・根張り促進　・着果促進 ・花芽分化　・ツルぼけ防止	【サンバリア】 500 倍～1000 倍 ・日ヤケ対策 ・果面障害軽減 ※各種銅剤の使用時期に散布することで特徴が発揮	【アイスバリア】 (トレハロース) 通常時 500 倍 応急時 300 倍 ・しおれ対策 ・小玉すいかの裂果対策
交配 20 日後 肥大後期	【エイトビー】 1000 倍 ・草勢維持 ・葉巻きたんそ対策			

※①散布量は農薬に準ずる　※②全ての製品は使用制限なし　※③かん水での使用可能