



# 有機酸(蟻酸)カルシウム肥料

# スイカル®



## ◆成分◆ (%)

カルシウム CaOとして	42.0
-----------------	------

有機酸(蟻酸)カルシウム

## ◆使用目的◆

- カルシウム欠乏対策  
(ビターピット、コルクスポット、  
軟化、油上がり)
- 貯蔵性向上

### 荷姿及び包装

・1kg×20袋

## 製品特長

当社の有機酸(蟻酸)カルシウム剤のベースになっているロングセラーモデルです。


カルシウムの補給により、様々な生理障害の防止・軽減を図ります。

また、当社亜リン酸製品(トップスコア・リン)との混用散布が可能です。

◇使用方法◇


農薬使用時期に散布可能

倍数、回数に制限はなし

作物	散布目的	散布時期	倍数
 りんご	カルシウム欠乏（ビターピット、コルクスポット、軟化、油上がり）対策、貯蔵性向上	落花直後又は落花10日後から 5～6回	1,000倍
<p>●干ばつ等の影響で上記の散布時期に<b>使用回数が少ない</b>又は<b>使用できなかった</b>場合                  ●着果不足・チッソ過多・強樹勢の場合</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>※応急時や強く効かせたい場合</b></p>			
りんご (つがる、王林、ジョナゴールド、世界一 など)	カルシウム欠乏（ビターピット、コルクスポット、軟化、油上り）対策、貯蔵性向上	7/月上旬～9/中旬 3～5回	333倍

※高温・干ばつ時の散布で葉が褐変することもあるため、樹勢の弱い樹の散布には十分注意

◇ビターピットの発生要因◇



◇対策◇

- ①若木、樹勢が強い場合：カルシウムの**散布回数を増やす**。又は**高濃度散布**。  
特につがる、王林、ジョナゴールド
- ②6～7月に干ばつした場合：後半の遅伸びを予想して**7月以降「スイカル」333倍×3回**。

◇使用上の注意◇

- ・リン酸系肥料との混用は避けてください。
- ・当社亜リン酸製品（トップスコア・リン）との混用が可能です。
- ・別々に溶かしたものを混用してください。

製造元 晃栄化学工業株式会社 

本社 〒460-0003

名古屋市中区錦1-7-34 ステージ錦 I

TEL : (052) 211-4451 FAX : (052) 211-4579


札幌営業所 TEL:011-707-4531

弘前営業所 TEL:0172-27-1768

松本営業所 TEL:0263-32-4441

熊本営業所 TEL:096-365-2081

～インスタ配信中～



KOEI.CHEM

ぜひフォローお願いします！