


＜ニンニク 葉面散布肥料使用例＞

例) 青森県

時期	商品	目的	備考
4/中旬	<p>【トップスコア・リン】</p> <p>2.000 倍×2 回</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 茎葉の未消化チッソ濃度を減らし、根はり促進 ・ 低温時のリン酸欠乏対策 ・ 苦土補給による葉色向上 <p style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;">カルシウム剤（バイカルティ・液体ハイカルック）と混用可能</p>	<p>カルシウム資材</p> <p>【バイカルティ】 </p> <p>1.000 倍</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 薬液の速乾性向上
4/下旬			
5/月上旬	<p>【アミノベスト】</p> <p>1.000 倍×3 回</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 植物性アミノ酸と微量要素補給 ・ 光合成向上による生育促進、肥大促進 	<p>※各種銅剤の使用時期</p> <p>に散布することで、</p> <p>バイカルティの特徴が</p> <p>発揮されます</p>
5/月中旬			
5/月下旬			
6/月上旬	<p>【トップスコア・リン】</p> <p>1.000 倍×2 回</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ チッソ吸収の抑制による養分転流促進 ・ 玉肥大の充実 ・ 品質向上 <p style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;">カルシウム剤（バイカルティ・液体ハイカルック）と混用可能</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 葉先枯れ対策 <p>【液体ハイカルック】</p> <p>500 倍</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 葉先枯れ対策 
6/月中旬			

※散布量は農薬に準ずる。