

水稻の増収、品質向上は健苗育成から

リンクエース®

保証成分…リン酸 5.2% マグネシウム 1.4%
有効成分…リン酸 5.5% マグネシウム 1.5%

リン酸マグネシウム

1. 育苗期の使用方法

【使用目的】 根はり促進・徒長対策・初期生育向上

【使用倍率】 1000 倍

【使用時期】 1 回目：1.5～2.0 葉期
2 回目：2.5～3.0 葉期

【使用量】 育苗箱 1 枚当たりリンクエースを
0.5 g 投入します。

希釈の目安 (1000 倍)

育苗箱枚数	投入量	水量
1 枚	0.5g	0.5 L
1000 枚	500g	500 L
2000 枚	1000 g	1000 L

※ 平成 11 年度北海道指導参考



2. 生育期の使用方法

【使用目的】 低タンパク良食味化、粒重増、屑米軽減

【使用量】 10 a 当たり 100 g

【使用時期】 1 回目：出穂期
2 回目：1 回目使用後 7～10 日後
3 回目：2 回目使用後 7～10 日後

使用上の注意

葉面散布を行う場合、展着剤を加用して下さい。又、カルシウムを含有する薬剤と混用すると結合し沈殿することがありますので混用しないで下さい。

本品は酸性の為、石灰硫黄合剤と混合すると致死性の硫化水素ガスが発生して危険ですので絶対に混合しないで下さい。

◇ 容姿 1k g ポリ袋入り 20 袋ダンボール箱詰め

お取扱い

製造元

Koel Chemical

晃栄化学工業株式会社

本社 / 〒460-0003 名古屋市中区錦 1-7-34 ステージ錦 TEL(052)211-4451(代) FAX(052)211-4579
札幌営業所 / 〒060-0806 札幌市北区北 6 条西 6 丁目 1-14 粟井ビル TEL(011)707-4531(代) FAX(011)707-4537
弘前営業所 / 〒036-8093 弘前市大字城東中央 3 丁目 9 番 青森りんご会館 TEL(0172)27-1768(代) FAX(0172)27-1786
東京営業所 / 〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-17-6 トルテックビル TEL(03)3863-6131(代) FAX(03)3863-6134
松本営業所 / 〒390-0805 長野県松本市清水 1-9-30 TEL(0263)32-4441(代) FAX(0263)32-4443
熊本営業所 / 〒862-0911 熊本市東区健軍 1 丁目 4 番 15 号 TEL(096)365-2081(代) FAX(096)365-1008