

りんご 葉面散布剤使用例

省力商品：★

月	時期	散布量 /10a	商品、目的		
4	展葉 7 日後	350~600 ℓ	【アイスバリア】 333倍×3回  <ul style="list-style-type: none"> カラマツ対策 霜、低温対策 	【プラスB】 2,000倍×1回 <ul style="list-style-type: none"> 結実安定 花粉管の伸長促進 花粉の発芽促進 授粉環境の向上 果形の安定 ※溶液授粉にも混用可能 	★ 【エコルーキー】 100~150倍 散布タイミング ①頂芽側花70~80%開花時 ②えき芽側花70~80%開花時 <ul style="list-style-type: none"> 摘果、省力化、大面積栽培 大玉高品質生産 ※新提案 えき花芽を狙い2回散布 ⇒頂花芽狙い(1回目散布)が不安な方へ 
	開花直前	350~600 ℓ			
5	落花直後	350 ℓ	【バイカルティ】 1,000倍×3~5回  <ul style="list-style-type: none"> ビターピット 薬液乾燥促進 油あがり、軟化 貯蔵性向上 		★ 【アミノベスト】 1,000倍×3~4回 ミクロデナポン摘果効果促進 摘果剤散布時 1,000倍×1 <ul style="list-style-type: none"> 花疲れ、葉色向上 肥大促進 
	落花 10 日後	420 ℓ			
6	落花 20 日後	500 ℓ	【スイカル】 333~1,000倍×2~3回  <ul style="list-style-type: none"> ビターピット 油あがり 内部褐変 	【トップスコア・リン】 1,000倍×3回  <ul style="list-style-type: none"> 花芽充実 隔年結果予防 二次伸長抑制 貯蔵養分増進 未消化チッソの代謝 	★ 【エキタイマグ】 1,000倍×3~4回 <ul style="list-style-type: none"> 苦土欠対策 (常習地、発生後は500倍) 
	落花 30 日後	500 ℓ			
	落花 40 日後	500 ℓ			
7	7 / 初め	500 ℓ	【サンバリア】 1,000倍×3~4回  <ul style="list-style-type: none"> 陽向面ヤケ、日ヤケ 果点荒れ、サビ ビターピット 	【トップスコア・リン】 又は 【リンクエース】 【ピーエムビー】 1,000倍×2~3回  <ul style="list-style-type: none"> 着色促進 糖度向上 	★ 【はっとり君】 1,000倍×1~2回 ジョンカラープロの効果安定 摘葉剤使用時期 1,000倍×1回  <ul style="list-style-type: none"> 葉の立ち上がり促進
	7 / 半ば	500 ℓ			
	7 / 末	500 ℓ			
8	8 / 半ば	500 ℓ			
	8 / 末	500 ℓ			
9	9 / 半ば	500 ℓ			

